



**Socialförvaltningen**



## **Generell behandlingsanvisning vid överkänslighetsreaktion**

Beslutat av:	Hälsocentralen Tibro
Gäller för:	Socialförvaltningen vård och omsorg
Gäller från och med:	2023-11-01
Tidpunkt för aktualisering:	2024-10-31
Dokumentägare:	Medicinskt ansvarig sjuksköterska



## Generell behandlingsanvisning vid överkänslighetsreaktion i samband med vaccination

Gäller för kommunal hälso- och sjukvård inom Tibro kommun, vård och omsorg Socialförvaltningen. Patienter med kommunal hälso- och sjukvård och personal som är listade på följande vårdcentral:

Hälsocentralen, Tibro

Behandlingsanvisningen är giltig till 2024-10-31

Kontakta ansvarig läkare så snart som det går utifrån situationen

### Anafylaktisk reaktion

Vid misstänkt eller begynnande tecken på anafylaktisk reaktion – t ex urtikaria som sprider sig över kroppen, obehagskänsla, angioödem/svullnad i ansikte, halsen och munnen, andningssvårigheter eller astmareaktion, blekhet, kallsvettning, takykardi, oro, förvirringstillstånd, sjunkande blodtryck.

- Ge adrenalin, injektion Emerade eller Epipen, förfylld spruta 0,3 mg/dos intramuskulärt
- Tillkalla ambulans – ring 112
- Ge kortison, Betametason 0,5 mg 12 tabletter - upplösta i vatten
- Ge Desloratadin 5 mg 2 tabletter
- Adrenalininjektion kan upprepas efter 10 min
- Puls och blodtryck kontrolleras fortlöpande
- Sänkt huvudända, eventuellt framstupa sidoläge

Tibro

231026

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Ansvarig Läkare

PETRA ANDRÉ-EKLUND  
Allmänläk, Spec allm med  
Hälsocentralen AB, 544 32 HJO  
0503-312 00 Fax 312 20



## Generell behandlingsanvisning vid överkänslighetsreaktion

Beslutat av: Närhälsan Tibro  
Gäller för: Socialförvaltningen vård och omsorg  
Gäller från och med: 2023-11-01  
Tidpunkt för aktualisering: 2024-10-31  
Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska



## Generell behandlingsanvisning vid överkänslighetsreaktion i samband med vaccination

Gäller för kommunal hälso- och sjukvård inom Tibro kommun, vård och omsorg Socialförvaltningen. Patienter med kommunal hälso- och sjukvård och personal som är listade på följande vårdcentral:

### Närhälsan vårdcentral, Tibro

Behandlingsanvisningen är giltig till 2024-10-31

Kontakta ansvarig läkare så snart som det går utifrån situationen

### Anafylaktisk reaktion

Vid misstänkt eller begynnande tecken på anafylaktisk reaktion – t ex urtikaria som sprider sig över kroppen, obehagskänsla, angioödem/svullnad i ansikte, halsen och munnen, andningssvårigheter eller astmareaktion, blekhet, kallsvettning, takykardi, oro, förvirringstillstånd, sjunkande blodtryck.

- Ge adrenalin, injektion Emerade eller EpiPen, förfylld spruta 0,3 mg/dos intramuskulärt
- Tillkalla ambulans – ring 112
- Ge kortison, Betametason 0,5 mg 12 tabletter - upplösta i vatten
- Ge Desloratadin 5 mg 2 tabletter
- Adrenalininjektion kan upprepas efter 10 min
- Puls och blodtryck kontrolleras fortlöpande
- Sänkt huvudända, eventuellt framstupa sidoläge

Tibro

231017

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

*Annika Klar*

231016

Ansvarig Läkare

*Stefan Solthle*

*Närhälsan Tibro våc*