

Dnr. 2013/71/738  
Vaccination  
Läkemedel  
HSL

fastställd: 2014-10-20  
reviderad: 2015-11-16

## **Rutin för vaccination mot pneumokocker för vuxna och barn över 5 år i Tibro kommun**

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas tillsammans med influensavaccination.

Rutinen är avsett för vaccination av personer över 5 år ålder. Patienter inskrivna i hälso- och sjukvården i Tibro kommun erbjuds gratis Pneumokockvaccinering.

Årets vaccin heter:

- **Pneumovax®** (polysackaridvaccin)
- **Prevenar13®** (proteinkonjugatvaccin)

För friska personer, 65 år eller äldre, rekommenderas polysackaridvaccin (Pneumovax®). För patienter med nedsatt immunförsvar, vissa kroniska sjukdomar eller riskfaktorer beslutar behandlande läkare vilket eller vilka av de två vaccinerna (Prevenar13® och Pneumovax®) som ska användas.

Pneumovax är det vaccin som köpts in till kommunen, vid behov av Prevenar13 får ssk vända sig till Närhälsan. Kostnaden får då faktureras kommunen. Meddela därför MAS.

**Kommunens sjuksköterskor med speciell behörighet inom ramen för generella vaccinationsprogram SOSFS 2006:24** är behöriga att ordinera pneumokockvaccination i enlighet med de vaccinationsprogrammen som finns upptaget i socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker.

**Kommunens sjuksköterskor utan speciell behörighet** ansvarar för att verkställa ordinationen enligt givna anvisningar.

### **Riskgrupper som rekommenderas pneumokockvaccination**

- Alla personer som är 65 år eller äldre
- Personer med vissa kroniska sjukdomar
  - Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  - Instabil diabetes mellitus
  - Kronisk lever- eller njursvikt
  - Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  - Cystisk fibros
- Personer med vissa risktillstånd
  - Nedsatt mjältfunktion (anatomiskt eller funktionellt)
  - Extrem övervikt (störst risk vid BMI > 40)



- Gravyt nedsatt immunförsvar
- Cochleaimplantat
- Likvorläckage

**Läkare ska alltid ordinera vaccin till patienter som inte ingår i riskgrupperna.**

### **Pneumokockvaccinering**

1. Omvårdnadsansvarig ssk/dsk ansvarar för att inskrivna patienter blir erbjudna vaccination mot pneumokocker.  
Tillfråga anhörig/närstående om personen själv inte kan ta ställning. Om inte någon anhörig/närstående finns avgörs detta av omvårdnadsansvarig sjuksköterska och patientansvarig läkare.

Information ska även ges om den sammanhållna journalfunktionen i Svevac. D.v.s. varje person måste tillfrågas om samtycke till att vaccinationsuppgifterna blir tillgängliga för andra vårdgivare i Svevac.

**Given information och beslut ska dokumenteras i omv.journalen för patienten.**

2. Inför vaccinationen ska frågeformulär inför din vaccination mot pneumokocker fyllas i, blankett: *Blankett för vaccination mot pneumokocker*
3. Ordination av vaccin mot pneumokocker görs av patientansvarig läkare eller kommunens sjuksköterskor med speciell behörighet inom ramen för generella vaccinationsprogram SOSFS 2006:24. Ordinationen dokumenteras på blankett: *Blankett för vaccination mot pneumokocker*.
4. Vaccination utförs av ssk/dsk anställd i Tibro kommun enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering.  
Vid akut infektion eller feber – vänta tills infektionen är över. Har patienten haft en allvarlig lunginflammation vänta med vaccination minst 2 månader efter lunginflammationen.
5. Vaccinering skall ske på dagtid, när vårdcentralen är öppen.
6. I samband med vaccinering **skall** inj. Epipen/Anapen finnas tillgänglig. Inj. Epipen/Anapen finns eller kan beställas via akutförrådet.
7. Dokumentera i Svevac när vaccination mot pneumokocker har mottagits. Lägg underlaget för vaccinationen i patientjournalen.



## Doseringsanvisning Pneumovax

Vaccinationen ges intramuskulärt i armens deltoideusmuskel. Vid Waranbehandling ges vaccinet djupt subcutant i armen, nedanför deltoideusmuskeln.

## När behövs förnyelsedos?

- För friska personer, 65 år eller äldre, rekommenderas inte längre förnyad pneumokockvaccination.
- För övriga personer med kroniska sjukdomar eller andra riskfaktorer avgör behandlande läkare tidsintervallet till nästa dos av pneumokockvaccin, samt typ av vaccin.

*Ovanstående rekommendationer bygger huvudsakligen på nationella riktlinjer (SOSFS 1994:26). Dessa riktlinjer är under omarbetning och kommer att revideras när ytterligare dokumentation om pneumokockvaccination till vuxna och äldre barn finns tillgänglig.*

## Aktuella blanketter i samband med influensavaccination

- Blankett för vaccination mot Pneumokocker (*journalhandling*)
- Uttag av Pneumovax (*till kylskåpet där vaccinet förvaras*)

## Forozan Magouli

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

***Smittskyddsenheten är samordningsansvarig för vaccination mot pneumokocker och influensavaccinationsprogrammet.***

<http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Strategisk-utvecklingsenhet/Smittskyddsenheten/Vaccinationer1/Pneumokockvaccinationer/>